

王克穷主任医师运用抵挡汤验案举隅

杨 朋¹ 王克穷^{2*} 任梅梅¹ 张海鸥¹

(1. 陕西中医药大学, 陕西 咸阳 712046; 2. 陕西中医药大学附属医院, 陕西 咸阳 712000)

摘 要:王克穷主任医师运用抵挡汤治疗以下焦瘀热互结偏于瘀血为主要病机的病症常获得较好的临床效果,通过分析导师治疗胃癌肝转移并发老年性痴呆案和贫血并发子宫腺肌病案,体现其在临床上的中医辨证思路和对中医腹诊的运用,为临床运用抵挡汤治疗相关病症提供临床经验。

关键字:经方; 验案; 抵挡汤; 王克穷

中图分类号: R289.9 文献标识码: A 文章编号: 2096-1340(2017)03-0027-03

DOI: 10.13424/j.cnki.jscetm.2017.03.011

王克穷主任医师, 陕西中医学院附属医院肿瘤内科主任, 医学博士, 从事肿瘤病的研究近三十年, 集临床、教学、科研于一身, 学验丰富, 博采众长, 尤善运用经方本源剂量^[1-2]治疗内科杂病, 临证遣药每获奇效。笔者有幸跟随王克穷教授学习, 获益匪浅。现就导师运用抵挡汤经验介绍如下。

抵挡汤组成: 水蛭(三十个, 熬)40克, 虻虫(三十个, 熬, 去翅足)10克, 桃仁(二十个, 去皮尖)6克, 大黄(三两, 酒洗)45克。用法: 上四味, 以水五升(1000ml), 煮取三升(600ml), 去滓, 温服一升(200ml)。不下, 更服。

1 病案举例

1.1 胃癌肝转移并发老年性痴呆案 刘春瑞, 男, 78岁。于2013年8月8日以贲门癌收住入院。自诉2013年6月14日因双上肢活动不灵活10余年于中铁二十局中心医院住院治疗, 期间患者因胃部不适, 吞咽哽噎。遂于2013年6月27日行胃镜取活检, 病理检查报告示: (贲门)腺癌。上腹部CT平扫+增强示: 肝内左右叶多发大小不等类圆形低密度灶, 增强扫描病灶周边强化, 多考虑转移瘤, 建议进一步检查。既往有高血压病10余年; 脑梗塞史, 特发性震颤病史10余年; 症状性癫痫10余年。此次为求进一步治疗入住我科。

现症: 眩晕, 头重如裹, 阵发性头痛, 胃部胀满不适, 吞咽哽噎, 纳差, 喜忘, 头手震颤, 语言重复, 腹诊: 腹部平软, 左侧少腹急结。舌质暗, 有瘀斑, 苔薄白微黄, 脉沉细。癌胚抗原(CEA)↑340.05ng/mL。诊断: 胃癌肝转移; 老年性痴呆。《伤寒论》有云: “阳明证, 其人喜忘者, 必有蓄血。所以然者, 本有久瘀血, 故令喜忘, 屎虽硬, 大便反易, 其色必黑者, 宜抵当汤下之。”故辨证当属瘀热互结、风痰上扰。故给抵挡汤合半夏白术天麻汤活血化瘀、化痰熄风。学生有疑惑故问: “老师用经方素来崇尚本源剂量, 今何以予抵当汤1/4量?”王老师答曰: “其一, 有文献报道, 过用活血化瘀, 与胃癌转移呈正相关^[3-4]; 其二, 患者年事已高, 久病体虚, 不可大剂攻伐。”故处方如下: 水蛭10g, 桃仁5g, 大黄10g, 生半夏65g, 茯苓45g, 陈皮15g, 茯苓30g, 炙甘草15g, 天麻15g, 炒白芍45g, 白术30g, 虻虫3g。3剂, 上药以水1400mL, 煎煮至600mL, 去滓, 温分3服, 200mL/次。

2013年08月11日二诊: 自述服上药3剂, 稍有腹泻, 大便每天2次, 眩晕、头重如裹, 阵发性头痛有所改善, 然胃部仍感胀满不适, 吞咽哽噎, 喜忘, 头手震颤, 语言复述, 舌质暗, 有瘀斑, 苔薄白微黄, 脉沉细。上方继服以观进退。

2013年08月20日三诊: 服上药12剂, 眩晕、

* 通讯作者: 王克穷(1961-), 男, 主要研究方向: 恶性肿瘤的辨证施治及中医规范化治疗。E-mail: keqiongwang@