

# 自拟调胃方治疗慢性萎缩性胃炎临床观察

张绍俭 徐兆郁

(柞水县中医医院,陕西 柞水 711400)

**摘要:**目的 观察自拟调胃方治疗慢性萎缩性胃炎(CAG)的临床疗效。方法 将2012年2月~2015年12月在我院门诊就诊的符合纳入标准的病人分为二组,治疗组300例,予以自拟调胃方,对照组120例,予以摩罗丹、三九胃泰冲剂及维酶素片,三个月后观察疗效。结果 治疗组临床总有效率94.00%,病理疗效总有效率81.00%,幽门螺旋菌(HP)感染治疗总有效率84.60%,且能显著降低胃泌素血症,治疗前后差异均有显著性( $P < 0.05$ ),优于对照组( $P < 0.05$ ),在治疗过程中未出现任何毒副作用。结论 自拟调胃方。治疗CAG效果优于摩罗丹、三九胃泰冲剂及维酶素片治疗,值得在基层医院推广。

**关键词:**萎缩性胃炎;自拟调胃方;疗效观察

**中图分类号:** R 573.3<sup>+2</sup>      **文献标识码:** B      **文章编号:** 2096-1340(2016)06-0056-04  
**DOI:**10.13424/j.cnki.jsctcm.2016.06.018

慢性萎缩性胃炎是临床常见疾病,目前西药治疗无特效药,笔者根据其中医病因病机,自拟调胃方笔者于2012年2月~2015年12月采用自拟调胃方治疗慢性萎缩性胃炎治疗,并与服用摩罗

丹合用三九胃泰冲剂及维酶素片治疗进行对照,现将治疗结果予以报道。

## 1 临床资料

**1.1 一般资料** 治疗组300例,其中,男180,女

晚期食管癌48例疗效观察[J]. 中国全科医学,2003,6(1):79-80.

[5]徐海帆,谭风波,陈华兵. 自拟方剂配合放疗治疗中晚期食管癌的疗效观察[J]. 中国药房,2012,23(23):2185-2186.

[6]贺方学,魏来,马幼平,等. 顺食汤防治急性放射性食管炎的疗效观察[J]. 医药产业资讯,2005,2(24):70-71.

[7]汪瑞,童建东,汪竹,等. 三维适形放疗联合康莱特注射液治疗中晚期食管癌的耐受性研究[J]. 中国医药导报,2012,9(28):56-57.

[8]苑仁冰,庄永志. 威麦宁胶囊联合三维适形放疗治疗食管癌的临床研究[J]. 中国医药,2013,11(16):307.

[9]王慧杰,王朝霞. 扶正增效消瘿汤并后程加速超分割放疗治疗食管癌疗效观察[J]. 辽宁中医杂志,2004,31(5):373.

[10]许利纯. 半夏沙参赭石汤配合放射治疗中晚期食管癌36例临床观察[J]. 中国中医药科技,2007,14(2):129.

[11]许多文,叶延程,罗好曾,等. 扶正固本颗粒配合放射治疗中晚期食管癌临床疗效观察[J]. 中成药,2007,29(4):484-485.

[12]郭燕春,王旬果,陈少平,等. 艾迪注射液联合三维适形放疗治疗中晚期食管癌50例[J]. 陕西中医,2014,35(5):524-525.

[13]杨树明,张爱萍,蔡焦生. 参芪六味地黄汤加放疗治疗食管癌的临床研究[J]. 光明中医,2008,23(2):145-146.

[14]段林生,崔建青,张士义,等. 外放射加服食管逐瘀汤治疗中晚期食管癌临床疗效观察[J]. 肿瘤防治杂志,2001,8(3):302-303.

[15]马纯政,王蓉,张明智,等. 化痰散瘀法对中晚期食管癌放疗增效的研究[J]. 北京中医药大学学报,2014,37(12):830.

[16]孙寅娣,盛巍,王传玺,等. 回生口服液对急性放射性食管炎防治作用的临床疗效[J]. 世界华人消化杂志,2014,22(21):3019-3023.

[17]周映伽,黄杰,沈红梅. 中药加味桔梗汤防治放射性食管炎80例临床观察[J]. 昆明医科大学学报,2013,34(1):68-70.

[18]张春盈,孙淑君,刘英杰,等. 放疗同步中药治疗防治放射性食管炎临床观察[J]. 中国中医急症,2013,22(1):109-110.

[19]朱云云,陈杰,程惠华,等. 食管癌放疗胸骨受照射剂量与骨髓抑制的关系[J]. 现代肿瘤医学,2013,21(3):555-556.

[20]杨会彬,范丽霞,崔桂敏,等. 参精扶正方防治食管癌放疗所致骨髓抑制的临床疗效[J]. 中国实验方剂学杂志,2013,19(5):330-332.

(收稿日期:2016-06-11 编辑:方亚利)