

加味八珍汤加减联合XELOX方案 治疗进展期胃癌疗效研究

陈晓霞* 肖书星 胡爱群

(常州市金坛区中医医院, 江苏 常州 213000)

摘要:目的 观察加味八珍汤联合XELOX方案治疗进展期胃癌的疗效。方法 对照组选取21例采用单纯XELOX方案化疗,治疗组选取22例,在对照组的基础上口服加味八珍汤。结果 治疗组在疾病的控制率、血红蛋白、血小板的下降及恶心呕吐的控制率上并不明显优于对照组,无统计学意义($P>0.05$);治疗组化疗后白细胞下降的发生率明显少于对照组,两组对比具有统计学意义($P<0.05$);治疗组化疗后神经毒性及手足综合征的发生率明显少于对照组,并具有统计学意义($P<0.05$);治疗组能够明显改善化疗患者的生活质量及临床症状,具有统计学意义($P<0.05$);治疗组化疗后的KPS评分明显优于对照组,具有统计学意义($P<0.05$)。结论 加味八珍汤在减轻XELOX方案引起的白细胞下降、神经毒性、手足综合征方面具有一定疗效,并能改善患者的临床症状及体能状态,提高生活质量,提高患者化疗耐受性,值得推广。

关键词:进展期胃癌;加味八珍汤;XELOX化疗;疗效

中图分类号:R735.2 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-1340(2018)04-0054-04

DOI:10.13424/j.cnki.jsctcm.2018.05.018

胃癌是最常见的恶性肿瘤之一,我国的发病人数在逐年增加,占全球发病总数的42%^[1]。由于症状隐匿,早期诊断困难,确诊时2/3为进展期胃癌,难以治愈,5年生存率仅为15%。化疗在进展期胃癌中占据重要地位,但进展期胃癌的治疗效果差,临床症状突出,严重影响化疗的顺利进行。我科应用中西医结合治疗改善进展胃癌患者的生活质量,减轻化疗毒副反应,提高化疗耐受性取得一定的疗效,汇报如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2014年01月~2016年12月期间本院肿瘤科收治的并使用XELOX方案治疗进展期胃癌患者46例,其中男性27例,女性19例。年龄40~76岁,平均53.6岁。按随机数字表随机分为两组,每组各23例,治疗组因故1例病例脱落,实际入组22例,男13例,女9例;Ⅲ期患者5例,Ⅳ期患者7例;发生部位贲门部3例,胃窦部10例,胃体部8例,幽门部1例。对照组2例因故

退出本研究,实际入组21例,男13例,女8例;Ⅲ期患者6例,Ⅳ期患者15例;发病部位:贲门部4例,胃窦部9例,胃体部7例,幽门部1例。2组患者的性别构成、年龄、分期、发病部位等基线特征比较差异无统计学意义($P>0.05$)。

1.2 纳入标准 ①经病理诊断为胃肠道恶性肿瘤,其分期诊断标准是参照美国癌症联合委员会(AJCC)颁布的国际TNM分期标准(2010年第7版)中符合Ⅲ、Ⅳ期患者;②年龄在18~80岁;③KPS评分 ≥ 60 分;④入组前3个月内未接受放化疗者;⑤既往无精神病史;⑥中医辨证属脾气虚表现,参照《中药新药临床研究指导原则2002试行版》脾气虚证标准;⑦未合并其它恶性肿瘤病史;⑧预计生存期大于3月者;⑨自愿参加本课题研究并签署知情同意书。

1.3 排除标准 ①不符合入选标准患者;②伴有严重的心、肺、肝、肾功能损害或骨髓功能异常或伴有影响患者生存的疾病者;③对本研究中所用